

# 리바록사반 (Rivaroxaban)

(Xarelto 라고도 함)

뇌졸중 위험을 낮추기 위해 귀하에게 리바록사반이 제공되었습니다. 리바록사반은 혈전을 예방하고 치료하는데 사용되며 이는 심박 세동 (불규칙한 심장 박동)으로 초래되는 혈전을 포함합니다.



## 음식, 물과 함께 리바록사반을 복용하십시오



하루에 한 번 한 알을 복용하십시오.



매일 같은 시간에 이 약을 복용하십시오.



음식과 함께 이 약을 복용하면 효과가 더 좋습니다.

## 리바록사반 복용을 놓치면 혈전 위험이 증가됩니다

복용 시간을 놓쳤는데 당일에 기억을 한 경우 놓친 약을 복용하십시오. 다음 날에 기억을 한 경우, 놓친 약은 건너 뛰십시오.

놓친 약을 보완하려고 동시에 두 알을 복용하지 마십시오.

## 리바록사반은 장기적인 의약품입니다

- 정제 약품이 떨어지기 전에 처방전을 받으십시오.
- 주말과 휴가일에 충분한 정제 약품을 가지고 있도록 하십시오.
- 의사의 지시 없이는 리바록사반 복용을 멈추지 마십시오. 너무 일찍 멈추면 혈전과 뇌졸중을 초래할 수 있습니다.

## 의료 제공자에게 알려주십시오

새로운 약품이나 약초 보조 식품을 섭취하는 것이 안전한지 여부에 대해 의사나 약사에게 문의하십시오. 일부 의약품은 리바록사반에 영향을 미칠 수 있습니다.

모든 의료 제공자들 (예: 의사, 치과 의사, 약사 혹은 발 치료사)에게 리바록사반 복용에 대해 알려 주십시오. 수술, 치과 치료 및 일부 검사 이전에 리바록사반 복용을 멈추어야 할 수도 있습니다.

임신을 했거나 아기를 가지려 하거나 모유 수유를 시작한 경우 의사에게 알려주십시오.

### 리바록사반은 출혈 위험을 증가시킵니다

접촉 스포츠, 문신, 피어싱 및 강한 마사지를 피하십시오.

아래와 같은 부작용이 있을 경우 의사나 Healthline 0800 611 116 에 긴급하게 연락하십시오.

- 붉거나 갈색 소변 혹은 검은 대변
- 흔치 않은 피멍
- 코피
- 혈액 혹은 갈색 반점이 있는 기침
- 심한 두통
- 상처 혹은 낙상 후 과다 출혈

리바록사반에 관한 더 자세한 정보를 원하시면, [healthnavigator.org.nz/rivaroxaban](http://healthnavigator.org.nz/rivaroxaban)을 방문하십시오.

# Rivaroxaban

(Also known as Xarelto)

You have been given rivaroxaban to lower your risk of having a stroke. Rivaroxaban is used to prevent and treat blood clots, including those caused by atrial fibrillation (irregular heart beat).



## Take rivaroxaban with food and water



Take ONE tablet once a day.



Take your tablet at the same time each day.



Taking your tablet with food helps to make it work better.

## Missing doses of rivaroxaban increases your risk of getting a blood clot

If you have missed a dose and you remember on the same day, take the missed dose. If it is the next day, skip the dose.

DO NOT take two doses at the same time to make up for a missed dose.

## Rivaroxaban is a long-term medicine

- Get your prescription before you run out of tablets.
- Make sure you have enough tablets for weekends and holidays.
- Don't stop taking rivaroxaban unless your doctor tells you to. Stopping too early can lead to blood clots and stroke.

## Tell your healthcare provider

Ask your doctor or pharmacist if it is safe to take any new medicines or herbal supplements. Some medicines can affect rivaroxaban.

Tell all healthcare providers that you are taking rivaroxaban (eg, your doctor, dentist, pharmacist or podiatrist). You may need to stop rivaroxaban before surgery, dental care and some tests.

Tell your doctor if you become pregnant, are trying for a baby or start breastfeeding.

### Rivaroxaban increases your risk of bleeding

Avoid contact sports, tattoos, piercings and deep massage.

### Contact your doctor or Healthline 0800 611 116 urgently if you notice these side effects:

- red or brown pee, or black poo
- unusual bruising
- nosebleeds
- coughing up blood or brown spots
- bad headaches
- bleeding a lot after a cut or fall.

For more information about rivaroxaban, visit [healthnavigator.org.nz/rivaroxaban](http://healthnavigator.org.nz/rivaroxaban)